

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
 Саламаттык сактоо министрлигинин
 Дары-дармектер жана медициналык
 техникалар менен камсыздандыруу
 департаментинин директорунун
 орун басары
 Джанкорозова М. К.

М.К.

«08 май 2019 - ж.



ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

ГЕРБИОН® ЧЫРМООК СИРОБУ

Чырмоок жалбырактарынын кургак экстракти

Какырууну жасакшыртуу үчүн

Соодадагы аталышы

Гербион® чырмоок сиробу (Herbion ivy syrup)

Эл аралык патенттеген аталышы

Чырмоок жалбырактарынын экстракти

Дарынын түрү

Сироп

Курамы

1 мл сироптун курамында бар:

Активдүү зат: чырмоок жалбырактарынын кургак экстракти 30% м/м (5-7,5:1)¹ – 7 мг.

Көмөкчү заттар: суюк сорбитол (кристаллдашпаган) (E420), глицерин (E422), натрий бензоаты (E211), лимон кислотасынын моногидраты (E330), жыпар жыттуу бальзам (бальзамдын курамында бар: пропиленгликоль, этанол, цитронелл майы, Litsea cubeba цитраль экс., лимон майы жана кориандр майы), тазаланган суу.

¹ Өсүмдүктөн жасалган субстанция \ экстракт = 5 – 7,5:1. Экстрагент: этанол 30% (м/м).

Башка көмөкчү заттар: 0%.

Сүрөттөмөсү

Сарғыч-күрөң түстөгү өзгөчө жыты жана даамы бар сироп.
Табигый түрдөгү заттар үчүн мүнөздүү тунманын болушуна жол берилет.

Фармадарылык тобу

Сасык тумоонун жана жөтөлдүн симптомдорун жок кылуу үчүн дарылар. Какыртуучу дарылар. Чырмоок жалбырактарынын экстракти.

АТХ коду: R05CA12

Фармакологиялык қасиеттери

Гербион чырмоок сиробунун курамында муколитикалык жана бронхоспазмолитикалык каражат катары таасир берген кадимки чырмооктун жалбырактарынын экстракти бар. Дары какырыктын илээшкектигин төмөндөтүүгө шарт түзөт, какырууну жеңилдетет жана жөтөлдү тынчтандырат.

Колдонууга көрсөтмөлөр

Гербион чырмоок сиробу нымдуу жөтөлдө какыртуучу каражат катары колдонулат.

Колдонуу жолу жана дозалоо

Чоңдор жаса 12 жаштан улув өспүрүмдөр: 5-7,5 мл сироп күнүнө 3 жолу (суткасына 105-157,5 мг чырмоок жалбырактарынын кургак экстрактина туура келет).

4төн 12 жашка чейинки балдар: 5 мл сироп күнүнө 3 жолу (суткасына 105 мг чырмоок жалбырактарынын кургак экстрактина туура келет).

1ден 4 жашка чейинки балдар: 2,5 мл сироп күнүнө 3 жолу (суткасына 52,5 мг чырмоок жалбырактарынын кургак экстрактина туура келет).

1 жашка чейинки ымыркайлар: 2,5 мл сироп күнүнө 2 жолу (суткасына 35 мг чырмоок жалбырактарынын кургак экстрактина туура келет).

Гербион чырмоок сиробу тамактануудан көз карандысыз ичилиет. Жетиштүү өлчөмдөгү жылуу суу же чай менен ичүү сунушталат.

Эгер сиропту ичиш баштагандан кийин бир жума аралыгында симптомдору сакталса, анда дарыгер менен кеңешүү керек.

Каршы көрсөтмөлөр

Активдүү субстанцияга, аралия түркүмүндөгү башка өсүмдүктөргө же дарынын көмөкчү заттарынын бирине карата жогорку жеңек сөзгичтик.

Дары каражатын колдонуу боюнча өзгөчө көрсөтмөлөр

Эгер ооруулунун абалы 7 күн дарылоодон кийин жакшырбаса, же дем алуу кыйындаса, ириндүү какырык пайда болсо же дене табы көтөрүлсө, дарыгерге кайрылуу керек.

Адис менен алдын ала кеңешүүсүз кодеин же декстрометорфан өңдүү жөтөлгө каршы каражаттар менен биргеликте колдонуу сунушталбайт. Курчуу баскычындагы ашказаничеги жолдорунун оорулары бар бейтаптар этияттыкты сактапши керек.

Дарынын айрым ингредиенттери жөнүндө маанилүү маалымат

Гербион чырмоок сиробунун курамында сорбитол (E420) бар. Фруктозаны көтөрө албастык сейрек кездешүүчү тукум куучу бузулуулары бар бейтаптар бул дарыны ичпеши керек.

Дарынын курамында бир аз өлчөмдө этанол (спирт) бар – бир дозада 100 мгдан аз.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Ичиш баштоо алдында дарыгерге Сиз кандайдыр бир башка дары каражаттарын ичиш жатканыңызды же жакында ичкеницизди билдиришициз керек.

Башка дары каражаттары жана тамак-аш азыктары менен өз ара таасири жөнүндө маалыматтар жок.

Кош бойлуу жана бала эмизген мезгилде колдонуу

Кандайдыр бир дарыларды ичүү алдында дарыгер менен көнешүү керек.

Кош бойлуу жана бала эмизген мезгилде колдонуунун коопсуздугу боюнча маалыматтар чектелүү болгондугуна байланыштуу бейтаптардын бул категориясына колдонуу сунушталбайт.

Авто унаа айдоо жана потенциалдуу кооптуу механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасири

Дарынын авто унааны жана башка механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасири жөнүндө маалымдалган эмес.

Дозадан ашык колдонуу

Сунушталгандан ашык дозаны колдонууга болбайт.

Симптомдору: суткалык дозадан эки эседен ашкан дозаны ичүүдө көңүл айлануу, кусуу, диарея, дүүлүккөн абал болушу мүмкүн.

Дарылоо: симптомдоруна жараша.

Өткөрүп жиберген дозаны компенсациялоо учун сироптун эки дозасын ичүүгө болбайт.

Кыйыр таасири

Бардык дары каражаттарына окшош эле Гербион чырмоок сиробу айрым учурларда кыйыр таасирлерди пайда кылышы мүмкүн.

Тез-тез ($\geq 1\backslash 100$ дөн $<1\backslash 10$ чейин):

- көңүл айлануу, кусуу, диарея

Тез эмес ($\geq 1\backslash 1000$ ден $<1\backslash 100$ чейин):

- бөрү жатыш, тери исиркеги, купероза же дем алуунун кыйындашы түрүндө аллергиялык реакциялар.

Аллергиялык реакциялар пайда болгон учурда дарыны ичүүнү токтотуп жана дарыгер менен көнешүү керек.

Кошмо-баракчада эскертилбеген кыйыр реакциялар пайда болгон учурда, сураныч, алар тууралуу дарыгерге билдирициз.

Чыгаруу формасы

Сироп

150 мл сироп биринчи жолу ачылганын контролдогучу бар пластик капкагы бар күнүрт айнектен жасалган айнек флакондо. 1 флакон дозалоочу пластик кашык жана колдонуу боюнча нускама менен картон кутучага салынат.

Сактоо шарттары

30 °Сдан жогору эмес аба табында сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү

2 жыл.

Сиропту флаконду биринчи ачкандан кийин 3 ай аралыгында пайдалануу керек.

Дарыны жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарттары

Рецепти жок берилет.

Өндүрүүчү

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка щеста 6, 8501 Ново место, Словения

Кыргыз Республикасынын аймагында дары каражаттарынын сапаты боюнча

арыз доолорду (сунуштарды) кабыл алуучу уюмдун аталышы жана дареги

КРКАнын өкүлчүлүгүнүн кеңсеси д.д., Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 720001

Телефону: +(996) 312 662 250

Электрондук почтасы: pharmacovigilance.KG@krka.biz