

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Джанкорозова М.К.
«05» июня 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЕРБИОН® СИРОП ПЛЮЩА

Сухой экстракт листьев плюща

Для улучшения отхаркивания

Торговое название

Гербион® сироп плюща (Herbion® ivy syrup)

Международное непатентованное название

Плюща листьев экстракт

Лекарственная форма

Сироп

Состав

1 мл сиропа содержит:

Активное вещество: сухой экстракт листьев плюща 30 % м/м (5 – 7,5 : 1)¹ - 7 мг.

Вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (некристаллизованный) (E420), глицерин (E422), натрия бензоат (E211), лимонной кислоты моногидрат (E330), ароматный бальзам (бальзам содержит: пропиленгликоль, этанол, цитронелловое масло, цитраль экс. из Litsea cubeba, лимонное масло и кориандровое масло), вода очищенная.

¹ Субстанция растительного происхождения / экстракт = 5 – 7,5: 1. Экстрагент: этанол 30 % (м/м). Другие вспомогательные вещества: 0 %.

Описание

Сироп желтовато-коричневого цвета со специфическими запахом и вкусом.

Допускается наличие осадка, характерное для веществ природного происхождения.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Отхаркивающие препараты.

Плюща листьев экстракт.

Код ATX: R05CA12

Фармакологические свойства

Гербион сироп плюща содержит сухой экстракт листьев плюща обыкновенного, действующий как муколитическое и бронхоспазмолитическое средство. Препарат способствует снижению вязкости мокроты, облегчает отхаркивание и успокаивает кашель.

Показания к применению

Гербион сироп плюща применяется в качестве отхаркивающего средства при влажном кашле.

Способ применения и дозирование

Взрослые и подростки старше 12 лет: 5 - 7,5 мл сиропа 3 раза в день (соответствует 105 - 157,5 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).

Дети от 4 до 12 лет: 5 мл сиропа 3 раза в день (соответствует 105 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).

Дети от 1 года до 4 лет: 2,5 мл сиропа 3 раза в день (соответствует 52,5 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).

Младенцы до 1 года: 2,5 мл сиропа 2 раза в день (соответствует 35 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).

Гербион сироп плюща принимают вне зависимости от приема пищи. Рекомендовано запивать достаточным количеством теплой воды или чая.

Если симптомы сохраняются в течение недели после начала приема сиропа, то следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к активной субстанции, другим растениям семейства аралиевых или любому из вспомогательных веществ препарата.

Особые указания по применению лекарственного средства

В случае если состояние больного не улучшается после 7 дней лечения, или в случае появления затруднения дыхания, гнойной мокроты, или при повышении температуры следует обратиться к врачу.

Совместное применение с противокашлевыми средствами, такими как кодеин или дексстрометорфан, не рекомендовано без предварительной консультации со специалистом. Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения следует соблюдать осторожность.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата

Гербион сироп плюща содержит сорбитол (E420). Пациентам с редким наследственным нарушением непереносимости фруктозы не следует принимать этот препарат.

В препарате содержится небольшое количество этанола (спирта) - менее чем 100 мг на дозу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Перед началом приёма необходимо сообщить врачу о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо лекарственные средства.

Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами и продуктами питания.

Прием во время беременности и кормления грудью

Перед приемом каких-либо препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

В связи с ограниченными данными по безопасности применения в период беременности и лактации препарат не рекомендуется принимать данной категории пациентов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами

Не сообщалось о влиянии препарата на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Передозировка

Не следует принимать дозы, превышающие рекомендованные.

Симптомы: при приеме доз, превышающих суточную дозу более чем в два раза, возможны тошнота, рвота, диарея, возбужденное состояние.

Лечение: симптоматическое.

Не следует принимать двойную дозу сиропа, чтобы компенсировать пропущенный прием.

Побочное действие

Подобно всем лекарственным средствам Гербион сироп плюща в единичных случаях может вызывать побочные эффекты.

Часто ($\geq 1/100$ до $<1/10$):

- тошнота, рвота, диарея.

Нечасто ($\geq 1/1000$ до $<1/100$):

- аллергические реакции, проявляющиеся в виде крапивницы, кожной сыпи, купероза или затруднения дыхания.

В случае появления аллергических реакций следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае возникновения побочных реакций, не упомянутых в листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите о них Вашему врачу.

Форма выпуска

Сироп

150 мл сиропа в стеклянном флаконе из темного стекла с пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. 1 флакон с дозирующей пластиковой ложкой и инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года

Сироп необходимо использовать в течение 3 месяцев после первого вскрытия флакона.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Кыргызской Республики:

Офис представительства КРКА, д.д., Кыргызская Республика, г.Бишкек, 720001

Телефон: +(996)312 662 250

Электронная почта: pharmacovigilance.KG@krka.biz