

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар
департаментинин директору
Кысанов Т.А. 
«03» февраль 2021-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

ГЕРБИОН® БАКА ЖАЛБЫРАК СИРОБУ

Соодадагы аталышы

Гербион® бака жалбырак сиробу

Эл аралык патенттөлбөген аталышы

Жок

Дарынын түрү

Сироп

Сүрөттөмөсү

Күрөндөн кызылт-күрөң түскө чейинки өзгөчө жыты бар сироп, бир аз жылтыроонун болушуна жол берилет.

Курамы

5 мл сироптун курамында бар:

активдүү заттар: ¹ланцет сыйкуу жалбырактуу бака жалбырактын жана гүлкайыр гүлдөрүнүн суюк суу аралашмасы маңызы 2,5 г, ²аскорбин кислотасы (С витамины) 65,00 мг; *комөкчү заттар:* сахароза, метилпарагидросибензоат (E218), апельсин майы жыт бергичи.

¹ланцет сыйкуу жалбырактуу бака жалбырактын жана гүлкайыр гүлдөрүнүн суюк суу аралашмасы маңызы төмөндөгүлөрдөн даярдалган: ланцет сыйкуу жалбырактуу бака жалбырак (*Plantago lanceolata L.s.l.*) 0,25 г; гүлкайыр гүлдөрү (*Malva sylvestris L.*) 0,25 г; тазаланган суу (экстрагент).

²73,12 мг натрий аскорбаты формасындагы 65,00 мг аскорбин кислотасы.

Фармадарылык тобу

Респиратордук системалардын ооруларын дарылоо үчүн препараттар. Суук тийүүдөгү ооруларын дарылоо үчүн жөтөлгө каршы препараттар жана каражаттар. Башка жөтөлгө каршы препараттар.

АТХ коду: R05X

Фармакологиялык қасиеттери

Гербион® бака жалбырак сиробунун курамында ланцет сыяктуу жалбырактуу бака жалбырактын (*Plantago lanceolata L.*) жана гүлкайыр гүлдөрүнүн (*Malva sylvestris L.*) суу маңызы, ошондой эле аскорбин кислотасы (С витамины) бар.

Дары полисахариддердин жогорку дем алуу жолдорунун былжыр челине механикалык таасиригин аркасында жөтөлгө каршы таасирге ээ болот; ошондой эле какыртуучу, сезгенүүгө каршы, микробго каршы (бактериостатикалык) таасирге ээ болот.

Аскорбин кислотасы (С витамины) организмде бир катар зат алмашуу процесстерине катышат, иммун системасын чындайт жана клеткалардын кайрадан калыбына келишине шарт түзөт.

Колдонууга көрсөтмөлөр

Препарат кургак жөтөл менен коштолгон, жогорку дем алуу жолдорунун сезгенүү ооруларын комплекстүү дарылоодо; ошондой эле чылым чеккендөр кургак жөтөлгөндө колдонулат.

Дозалоо режими жана колдонуу жолу

Чондорго жана 14 жаштан улуу балдарга дары 3-5 жолу 2 чен кашыктан (10 мл) дайындалат.

7ден 14 жашка чейинки курактагы балдарга – суткасына 3 жолу 1-2 чен кашыктан (5 -10 мл).

2ден 7 жашка чейинки курактагы балдарга – суткасына 3 жолу 1 чен кашык (5 мл).

Дарылоо курсунун узактыгы 2-3 жума. Дарыгер менен көнешкендөн кийин узактыгын узартууга же кайталап курс өткөрүүгө болот.

Ичилиет. Бейтаптар дарыны ичкендөн кийин дароо суюктук ичпей же тамак жебей турушу керек, анткени тамак жана суусундук дарыны ооз көндөйүнүн жана кулкундун былжыр челинен кетириүүнү тездетиши мүмкүн.

Пайдалануу алдында дары каражаты бар бөтөлкөнү чайкаш керек.

Каршы көрсөтмөлөр

Дарынын курам бөлүктөрүнө карата жогорку сезгичтик, кант диабети, тукум куучу фруктозаны көтөрө албастык, глюкоза-галактозаны сицириүүнүн бузулуу синдрому, тубаса сахараза-изомальтаза жетишсиздиги, 2 жашка чейинки бала курак.

Жагымсыз реакциялар

Аллергиялык реакциялар болушу мүмкүн. Кыйыр таасирлер пайда болгон учурда дарыны ичүүнү токtotуп жана дарыгерге кайрылуу керек.

Өзгөчө көрсөтмөлөр жана этияттык чарагалары

Энтигүү, дene табынын жогорулаши же кан аралаш какырык пайда болгондо дарыгерге кайрылуу керек.

Дары каражатын колдонуу убагында бейтап жетиштүү өлчөмдө жылуу суюктук (чай же башка жылуу суусундуктарды) ичиши керек.

Эгерде дарыны колдонуп баштагандан кийин бир жумадан соң оорунун симптомдору жоголбосо, дарыгерден көнеш алуу керек.

Гербион® бака жалбырак сиробунун курамында сахароза бар, ошондуктан кант диабети, сейрек тукум куучу фруктозаны көтөрө албастык, глюкоза жана галактоза мальабсорбциясы

жана сахароза-изомальтаз жетишиздиги оорулары бар бейтаптарга колдонууга каршы көрсөтүлөт.

Метилпарагидроксибензоат (Е 218) аллергиялык реакцияларды, анын ичинде жай типтеги реакцияны пайда кылышы мүмкүн.

Кош бойлуулукта жана бала эмизген мезгилде колдонуу

Кош бойлуу жана бала эмизген аялдарга дарыны колдонуу сунушталбайт (дарыны көрсөтүлгөн бейтаптар тобунда колдонуунун коопсуздугу боюнча маалыматтар жетишиздигине байланыштуу).

Унаа каражаттарын, механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө тийгизген таасири

Гербион® бака жалбырак сиробу унаа каражаттарын башкаруу жана механизмдер менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизбейт.

Башка дары препараттары менен өз ара таасири

Гербион® бака жалбырак сиробун жөтөлгө каршы препараттар жана какырыктын пайда болушун азайтуучу дары каражаттары менен бир убакта колдонууга болбойт, анткени бул суюлтулган какырыкты жөтөлүп түкүрүүнү кыйындатат.

Ашыкча доза

Азыркы убакка чейин ашыкча дозалоо учурлары жөнүндө маалыматтар түшкөн эмес.

Чыгаруу формасы

Сироп.

150 мл сироп суюктукту бөлгүчү бар желим тыгын жана биринчи жолу ачууну көзөмөлдөгүчү бар пластик капкак менен тыгындалып бекитилген, күңүрт айнек (III типтеги) флакондо.

1 флакон өлчөгүч пластик чен кашык жана колдонуу боюнча нускама менен бирге картон қутучага салынат.

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл

Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин препаратты колдонууга болбойт.

Сактоо шарттары

15 °C дан баштап 30 °C чейинки аба табында сактоо керек.

Сиропту флаконду ачкандан кийин 3 ай ичинде пайдалануу керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Дарыканалардан берүү шарттары

Рецепти жок берилет.

Таңгактоочу

КРКА, д.д., Ново место, Повхова көчөсү 5, 8501 Ново место, Словения

Өндүрүүчү

КРКА, д.д., Ново место, Шмаръешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Кыргыз Республикасынын аймагында дары каражаттарынын сапаты боюнча арыз-доолорду (сунуштарды) кабыл алуучу уюмдун атальышы жана дареги:

КРКА, д.д. өкүлчүлүгүнүн кеңеси, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.

Телефону: +(996) 312 662 250

Электрондук дареги: pharmacovigilance.KG@krka.biz