


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Абдиев М.К.
«18» декабря 2020г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЕРБИОН® СИРОП ПОДОРОЖНИКА

Торговое наименование

Гербион® сироп подорожника

Международное непатентованное наименование

Нет

Лекарственная форма

Сироп

Описание

Сироп от коричневого до красновато-коричневого цвета со специфическим запахом, допускается наличие небольшой опалесценции.

Состав

5 мл сиропа содержит:

активные вещества: ¹экстракт жидкой водной смеси подорожника ланцетовидного листьев и мальвы цветков 2,5 г, ²аскорбиновая кислота (витамин С) 65,00 мг;

вспомогательные вещества: сахароза, метилпарагидросибензоат (E218), ароматизатор апельсина масло.

¹экстракт жидкой водной смеси подорожника ланцетовидного листьев и мальвы цветков приготовлен из: подорожника ланцетовидного листьев (*Plantago lanceolata* L.s.l.) 0,25 г; мальвы цветков (*Malva sylvestris* L.) 0,25 г; воды очищенной (экстрагент).

²65,00 мг аскорбиновой кислоты в форме 73,12 мг натрия аскорбата.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы. Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний. Другие противокашлевые препараты.

Код АТХ: R05X

Фармакологические свойства

Гербион® сироп подорожника содержит водные экстракты листьев подорожника ланцетовидного (*Plantago lanceolata* L.) и цветков мальвы (*Malva sylvestris* L.), а также аскорбиновую кислоту (витамин С).

Препарат обладает противокашлевым эффектом благодаря механическому воздействию полисахаридов на слизистую оболочку верхних дыхательных путей; обладает также отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным (бактериостатическим) действием.

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в ряде метаболических процессов в организме, укрепляет иммунную систему и способствует регенерации клеток.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем; а также при сухом кашле курильщиков.

Режим дозирования и способ применения

Взрослым и детям старше 14 лет препарат назначается по 2 дозирующих ложки (10 мл) 3-5 раз в сутки.

Детям в возрасте от 7 до 14 лет - по 1-2 дозирующих ложки (5-10 мл) 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 2 до 7 лет - по 1 дозирующей ложке (5 мл) 3 раза в сутки.

Длительность курса терапии 2-3 недели. Увеличение длительности или назначение повторного курса терапии возможно после консультации с врачом.

Для приема внутрь. Пациентам не следует пить или принимать пищу сразу же после приема препарата, поскольку еда и напитки могут ускорить удаление препарата с поверхности слизистой оболочки полости рта и глотки.

Перед использованием необходимо встряхнуть бутылку с лекарственным препаратом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, сахарный диабет, врожденная непереносимость фруктозы, синдром нарушенного всасывания глюкозы-галактозы, врожденной недостаточности сахаразы-изомальтазы, детский возраст до 2 лет.

Нежелательные реакции

Возможны аллергические реакции. В случае появления побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Особые указания и меры предосторожности

При возникновении одышки, повышения температуры тела или появлении мокроты с кровью следует обратиться к врачу.

Во время приема лекарственного средства пациент должен выпивать достаточное количество теплой жидкости (чай или другие теплые напитки).

Если симптомы заболевания не исчезают через одну неделю после начала приема препарата, необходимо проконсультироваться с врачом.

Гербион® сироп подорожника содержит сахарозу, поэтому противопоказан для применения у пациентов с сахарным диабетом, с редкими наследственными заболеваниями непереносимости фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы или сахарозно-изомальтазной недостаточностью.

Метилпарагидроксибензоат (Е 218) может вызывать аллергические реакции, включая реакции замедленного типа.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременным и кормящим женщинам принимать препарат не рекомендуется (в связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата у указанной группы пациентов).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Гербион® сироп подорожника не оказывает влияние на способность управлять

транспортными средствами и работать с механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Гербион® сироп подорожника не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Передозировка

До настоящего времени сведений о случаях передозировки не поступало.

Форма выпуска

Сироп.

По 150 мл сиропа во флаконе из темного стекла (тип III), укупоренного пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышечкой с контролем первого вскрытия. 1 флакон помещают в пачку картонную вместе с дозирующей пластиковой мерной ложкой и инструкцией по применению.

Срок годности

3 года

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15 °С до 30 °С.

Сироп следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Упаковщик

КРКА, д.д., Ново место, Повхова улица 5, 8501 Ново место, Словения

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Кыргызской Республики:

Офис представительства КРКА, д.д., Кыргызская Республика, г. Бишкек

Телефон: +(996) 312 662 250

Электронная почта: pharmacovigilance.KG@krka.biz