



**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

ГЕРБИОН® ЧЫРМООК

Соодадагы аталышы
Гербион® чырмоок

Эл аралык патенттөлбөген аталышы
Жок

Дарынын түрү
Соруу үчүн таблеткалар

Курамы

1 соруу үчүн бир таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдуу зат: чырмоок жалбырактарынын кургак экстракты (5-7,5:1)¹ – 35 мг.

Көмөкчү заттар: изомальт (М тиби), лимон кислотасы (E330), сукралоза (E955), карамель жыпар жыт бергичи², цитрус жыпар жыт бергичи³, ачуу жалбырактарынын майы.

¹ Чырмоок жалбырактарынан кургак чырмоок жалбырактарынын экстракты (*Hedera helix L.*, Аралия түркүмү (*Araliaceae*), folium). Дарылык өсүмдүк чийки затынын баштапкы экстрактынын өлчөмүнө карата катышы: 5-7,5:1.

Экстрагент: 30% этанол (м/м).

² Карамель жыпар жыт бергичи төмөнкүлөрдү камтыйт: табигый даам-жыпар жыт берүүчү зат, жыпар жыт бергич, пропиленгликоль (E1520), суу.

³ Цитрус жыпар жыт бергичи төмөнкүлөрдү камтыйт: табигый даам-жыпар жыт берүүчү зат, жыпар жыт бергич, бутилгидроксианизол (E320).

Сүрөттөмөсү

Ачык күрөндөн күрөң түскө чейинки четтери кертилген жана бети бодуракай соруу үчүн тегерек таблеткалар. Сарыдан күрөң түскө чейинки кошундулардын, ачык түстөгү тактардын, аба көбүкчөлөрүнүн болушуна жана четтеринин бир аз тегиз эместигине жол берилет.

Фармадарылык тобу

Сүүк тийүү симптомдорун жана жөтөлдү чөттетүү үчүн препараттар. Экспекторанттар, жөтөлдү баскан айкалыштардан тышкary. Какырыкты чыгаруучу препараттар. Чырмоок жалбырактарынын экстракты.

АТХ коду: R05CA12

Фармакологиялык касиеттери

Препараттын курамында муколитикалык жана бронхоспазмолитикалык каражат катары таасир берүүчү жөнөкөй чырмоок жалбырактарынын кургак экстрактысы бар. Препарат какырыктын жабышкактыгын төмөндөтүүгө шарт түзөт, какырууну жөнелдетет жана жөтөлдү тынчтандырат.

Колдонууга көрсөтмөлөр

Гербион® чырмоок соруу үчүн таблеткалар препарат нымдуу жөтөлдө какыртуучу каражат катары колдонулат.

Дозалоо режими жана колдонуу жолу

Чоңдор, өспүрүмдөр жсана б жасаштан улдуу балдар: күнүнө 3 жолу 1 соруу үчүн таблетка (күнүнө 105 мг чырмоок жалбырактарынын кургак экстрактына туура келет).

Таблетканы толук эригенче ооздо соруу керек.

Гербион® чырмоок препараты менен дарылоо мезгилиnde жетиштүү өлчөмдө, бирок таблетканы соргондон кийин дароо эмес жылуу суу же чай ичүү сунушталат.

Таблеткаларды түздөн-түз тамактанууга чейин же тамактануу убагында колдонууга болбойт.

Дарылоо узактыгы – 7 күн. Дарыгердин сунушу боюнча курсу кайталоого болот.

б жасашка чейинки курактагы баңдар үчүн бул дары түрүндө препаратты өлчөмдө мүмкүн болбогондугуна байланыштуу, Гербион® чырмоок сиробу препаратты колдонуу сунушталат.

Каршы көрсөтмөлөр

Активдүү субстанцияга, аралия түркүмүндөгү башка өсүмдүктөргө же препараттын көмөкчү заттарынын бирине жогорку жекече сезгичтик.

Кыйыр таасирлери

Башка дары каражаттары сыйктуу эле Гербион® чырмоок препараты айрым учурларда кыйыр таасирлерди жаратышы мүмкүн.

Тез-тез ($\geq 1/100$ баштап $<1/10$ чейин):

- көнүл айнуу, кусуу, ич өтүү.

Көп эмес ($\geq 1/1000$ баштап $<1/100$ чейин):

- бөрү жатыш, тери бөртмөсү, купероза же дем кысылуу түрүндөгү аллергиялык реакциялар, сезимталдык реакция.

Аллергиялык реакциялар пайда болгон учурда препаратты ичүүнү токтолуп жана дарыгер менен көнешүү керек.

Өзгөчө көрсөтмөлөр жана колдонуудагы сактык чаралары

Эгерде оорулуунун абалы 7 күн дарылоодон кийин жакшырбаса, же дем кысылганда, ириндүү какырык пайда болсо же дене табы жогорулаганда дарыгерге кайрылуу керек.

Адистен алдын ала консультация алуусуз кодеин же декстрометорфан сыйктуу жөтөлгө каршы каражаттар менен биргеликте колдонуу сунушталбайт. Курчуу баскычындагы ашказан-ичеги жолдорунун оорулары бар бейтаптар этияттыкты сакташы керек.

Препараттын айрым ингредиенттери жөнүндө маанилүү маалымат

Гербион® чырмоок соруу учун таблеткалар препараттынын кумарында изомальт бар. Тукум куучу фруктозаны көтөрө албастыгы бар бейтаптар мууну эске альшы керек.

Кош бойлуулукта жана бала эмизген мезгилде колдонуу

Кандайдыр бир препараттарды колдонуу алдында дарыгерден кенеш алуу керек.

Кош бойлуу жана бала эмизген мезгилде колдонуунун коопсуздугу боюнча маалыматтар чектелүү болгондугуна байланыштуу препаратты бейтаптардын бул категориясына колдонуу сунушталбайт.

Унаа каражаттарын башкаруу жана механизмдер менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасири

Препараттын автоунааны жана башка механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасири жөнүндө маалымдалган эмес.

Ашыкча доза

Сунушталгандан көп дозаны колдонууга болбайт

Симптомдору: суткалык дозадан эки эседен көп ашкан дозаларды ичүүдө көңүл айнуу, кусуу, ич өтүү, абалдын дүүлүгүүсү пайда болушу мүмкүн.

Дарылоо: симптомдоруна жараша.

Откөрүп жиберген дозаны компенсациялоо учун эки эсе дозаны колдонууга болбайт.

Башка дары препараттары менен өз ара таасири

Ичил баштоо алдында дарыгерге Сиз кандайдыр бир дары каражатын колдонуп жатканыңиз же бир аз мурун колдонгонунуз тууралуу маалымдашыңыз керек. Башка дары каражаттары жана тамак-аш азыктары менен өз ара таасири жөнүндө маалыматтар жок.

Жарактуулук мөөнөтү

2 жыл.

Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин пайдаланууга болбайт.

Сактоо шарттары

25°C дан жогору эмес аба табында, нымдан коргоо учун түп нуска таңгагында сактоо керек.

Балдар жетпеген орунда сактоо керек.

Чыгаруу формасы

Соруу учун таблеткалар.

8 таблеткадан ПВХ/ПЭ/ПВДХ фольгасынан жана алюминий фольгасынан жасалган блистерде.

2, 3 же 4 блистер колдонуу боюнча нускама менен бирге картон кутучага салынат.

Берүү шарттары

Рецепти жок берилет.

Өндүрүүчү

КРКА, д.д., Ново место, Шмаръешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Таңгактоочу

КРКА, д.д., Ново место, Рада Пушенъяка көчөсү 10, 9240 Лютомер, Словения

*Кыргыз Республикасынын аймагында дары кара жаттарынын сапаты боюнча арыз-
доолорду (сунуштарды) кабыл алуучу уюмдун атальшы жана дареги:
КРКА, д.д. өкүлчүлүгүнүн кеңсеси, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,
Телефон: +(996) 312 662 250
Электрондук почта: pharmacovigilance.KG@krka.biz*